

Polinomios (fracciones algebraicas)

1. Simplificación de fracciones algebraicas

EJEMPLO SIMPLE. Factoriza y simplifica:

$$\frac{3x^3 + 15x^2}{3x^2} \left\{ \frac{\text{Se aplica factor común}}{\text{No se puede factorizar}} \right\} = \frac{3x^2 \cdot (x+5)}{3x^2} \left\{ \text{Se tacha } 3x^2 \right\} = x + 5$$

EJEMPLO COMPLEJO. Factoriza y simplifica:

$$\frac{24x^7 - 24x^6 - 6x^5 + 6x^4}{8x^8 - 16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}}{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}}{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}}{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}}{\text{Se aplica: } 1^{\circ} \text{ factor común, } 2^{\circ} \text{ Ruffini y } 3^{\circ} \text{ identidades notables}} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \left\{ \frac{1}{16x^7 + 10x^6 - 2x^5} \right\} = \frac{1$$

$$= \frac{6x^4 \cdot (x + 1) \cdot (2x + 1) \cdot (2x + 1)}{2x^5 \cdot (x + 1) \cdot (2x + 1) \cdot (2x + 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } (2x - 1) \} = \frac{3(2x + 1)}{x(2x - 1)} \{ \text{Se simplifican los f. comunes y se tacha: } (x - 1) \text{ y } ($$

1.1 POLINOMIOS FACTORIZADOS. Simplifica cuando sea posible:

a.
$$\frac{2x+1}{2x-1}$$
 -> Sol.: No se puede

c.
$$\frac{2x^3(x+1)^2}{6x(x+1)}$$
 -> Sol.: $\frac{x^2(x+1)}{3}$

b.
$$\frac{2(x+1)}{2(x-1)(x+1)}$$
 -> Sol.: $\frac{1}{x-1}$

d.
$$\frac{8x^4(2x+1)(2x-1)}{2x(x+1)(2x-1)}$$
 -> Sol.: $\frac{4x^3(2x+1)}{3(x+1)}$

■ 1.2 DIFICULTAD MEDIA (factorización de un solo paso). Factoriza y simplifica:

a.
$$\frac{9x^6 - 9x^5}{3x^3 - 3x^2}$$
 -> Sol: _ _ x^3

d.
$$\frac{4x^2-4x+1}{10x^2-5x}$$
 -> Sol.: $\frac{2x_{---}}{5x}$

b.
$$\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$$
 -> Sol.: $\frac{x+1}{x}$

e.
$$\frac{4x^2+4x+1}{4x^2-1}$$
 -> Sol.: $\frac{2x+1}{2x}$

c.
$$\frac{x^2 + x - 2}{2x - 2}$$
 -> Sol.: $\frac{x_{---}}{2}$

f.
$$\frac{x^4 + 4x^2 + 4}{x^3 - 2x^2 + 2x - 4}$$
 -> Sol.: $\frac{x^2 + 2}{x_{--}}$

1.3 DIFICULTAD ALTA (factorización de varios pasos). Factoriza y simplifica:

a.
$$\frac{4x^6+4x^5+2x^4+2x^3}{8x^7-2x^3}$$
 -> Sol.: $\frac{x+1}{2x^2}$

b.
$$\frac{36x^9 - 36x^8 - 9x^5 + 9x^4}{6x^6 - 6x^5 + 3x^4 - 3x^3}$$
 -> Sol.: $3x(2x^2 - - -)$